

	INFORMACION TÉCNICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS
	BISMUXIL PET'S® Subsalicilato de Bismuto 10 mg/mL PASTA ORAL

BISMUXIL PET'S®

No de Registro Q-0666-057

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Subsalicilato de bismuto.....10 mg

Excipientes c.b.p.....1 mL

INDICACIONES:

Bismuxil Pet's es un Antidiarreico, citoprotector y antisecretor intestinal, indicado en el tratamiento inespecífico de gastroenteritis. Inhibe la inflamación mediada por prostaglandinas, la secreción inducida y la motilidad anormal.

Protege la mucosa gastrointestinal por disminución del peristaltismo, con efecto antibacteriano. Forma un revestimiento protector estimulando la producción de moco.

FARMACODINAMIA:


El Subsalicilato de Bismuto se separa en el intestino delgado en carbonato de bismuto y salicilato. El Bismuto se liga a las bacterias para luego ejercer una acción bactericida conjunta, impidiendo la adherencia a la mucosa del TGI. El Ácido salicílico a través de mecanismos antiprostaglandínicos, ejerce una acción antienterotoxémica, antibacteriana, antisecretora y antiinflamatoria.

Estas acciones se incrementan en pH ácido.

FARMACOCINÉTICA:

El Subsalicilato de Bismuto es una sal insoluble en agua. Es hidrolizado en el estómago por acción del jugo gástrico, convirtiéndose en Ácido salicílico y en Oxiclورو de bismuto, sal insoluble. El Salicilato liberado se absorbe en un 90% y es excretado por la orina. El Bismuto, en contraste, se absorbe en mínima cantidad eliminándose por excremento.

Los salicilatos se unen a las proteínas plasmáticas y se metaboliza en el hígado a ácido salicílico. El ácido salicílico, metabolitos de salicilatos conjugados y cualquier bismuto absorbidos se excretan por vía renal.

	INFORMACION TÉCNICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS
	BISMUXIL PET'S® Subsalicilato de Bismuto 10 mg/mL PASTA ORAL

CONTRAINDICACIONES y ADVERTENCIAS:

Bismuxil-Pet's® está contraindicado en aquellos pacientes sensibles a salicilatos. Los felinos domésticos son especialmente sensibles a los salicilatos en presencia de inflamación intestinal. El color de las heces puede oscurecerse. En altas dosis puede ocurrir impactación fecal. El Subsalicilato de bismuto es radiopaco y puede interferir con estudios radiográficos gastrointestinales.

REACCIONES ADVERSAS:


En animales con insuficiencia hepática o sensible a los salicilatos, los síntomas de intoxicación pueden cursar con: encefalopatías (ansiedad, confusión, depresión mental, espasmos musculares especialmente de la cara y mandíbula, temblores y movimientos incontrolables). Constipación severa, síntomas de salicilismo (pérdida de oído, confusión, diarreas continuas, vértigos, somnolencia severa, respiración rápida o profunda; sudoración; incremento de la sed; náusea o vómito severo o continuo; dolor de gástrico, severo o continuo; movimientos incontrolables de los miembros y problemas de la visión).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

La acción antimicrobiana de las tetraciclinas puede ser disminuida si es usada concurrentemente con Subsalicilato de Bismuto. Las tetraciclinas deberán ser administradas al menos 2 horas antes o después de la administración de Subsalicilato de Bismuto. Se ha notado un aumento de la toxicidad de la aspirina con el uso concurrente con Subsalicilato de bismuto.

TOXICIDAD Y SEGURIDAD:

Los datos preclínicos de estudios convencionales de toxicidad general y a dosis repetidas, de genotoxicidad y carcinogenicidad no indican un especial riesgo para los caninos. Dosis superiores a 13 mg/kg de Subsalicilato de Bismuto en felinos domésticos puede resultar en toxicidad.

	INFORMACION TÉCNICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS
	BISMUXIL PET'S® Subsalicilato de Bismuto 10 mg/mL PASTA ORAL

USO EN:

Caninos domésticos y felinos domésticos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Caninos domésticos: 2.0 – 4.0 mg/kg de peso corporal equivalente a 1 mL por cada 2.5-5.0 mg/kg de peso corporal tres veces al día.

Felinos domésticos: 2.0 – 4.0 mg/kg de peso corporal equivalente a 1 mL por cada 2.5 – 5.0 mg/kg de peso corporal tres veces al día durante 3 días.

La dosificación y duración del tratamiento será de acuerdo al caso clínico y criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN:

Caja con Jeringa dosificadora de 5, 15, 30 y 60 mL


RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar seco y fresco a no más de 30° C.
Protéjase de la luz.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Manténgase bien cerrado.
Consulte al Médico Veterinario.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Su venta requiere receta médica.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.

	INFORMACION TÉCNICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS
	BISMUXIL PET'S® Subsalicilato de Bismuto 10 mg/mL PASTA ORAL

HECHO EN MÉXICO POR:

INNOPHARMA, S. DE R. L. DE C.V.

Av. San Pablo No 79-C,
Col. Santa Bárbara,
Alc. Azcapotzalco, CP 02230,
Ciudad de México.
Tel: (55) 5382 2289
ventas@innopharma.com.mx
www.innopharma.com.mx