



INFORMACIÓN MÉDICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DOLFENO 120

Carprofeno
120 mg / tableta

DOLFENO 120

No de Registro Q-0666-046

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Carprofeno.....120.0 mg

Excipientes c.b.p..... 1 Tableta

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Dolfeno 120, está indicado para el tratamiento y control del dolor e inflamación, crónico y agudo, causados por osteoartritis, enfermedad articular degenerativa y procedimientos quirúrgicos en tejidos blandos, articulaciones y huesos en perros.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:

Cuando se administra por vía oral a perros, carprofeno es aproximadamente 90% biodisponible. Los niveles séricos máximos ocurren entre 1 - 3 horas después de la dosificación. El fármaco se une fuertemente a las proteínas plasmáticas (99%) y un bajo volumen de distribución (0,12-0,22 l / kg). Se metaboliza ampliamente en el hígado, principalmente por conjugación con ácido glucorónico y procesos oxidativos. Alrededor del 70 - 80% de una dosis se elimina en las heces, el 10 - 20% se elimina a través de la orina. Parte del metabolito inactivo puede reabsorberse por circulación enterohepática. El tiempo de eliminación en el perro es de aproximadamente 13 - 18 horas.

MECANISMO DE ACCIÓN

Carprofeno tiene actividad analgésica, antiinflamatoria, y antipirética por la capacidad que tiene de inhibir la actividad de la ciclooxigenasa de tipo II, (COX II) con la consecuente inhibición de la síntesis de prostaglandinas.

DOSIS: 4.4 mg/kg de peso corporal

Talla	kg de peso corporal	Número de tabletas
Grande	30 a 45	1 - 1 ½
	45 a 60	1 ½ a 2
Gigante	60 a 75	2 a 2 ½

Cada 24 horas. El tratamiento se recomienda durante 7 días de acuerdo al caso clínico y criterio del Médico veterinario.



INFORMACIÓN MÉDICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DOLFENO 120

Carprofeno
120 mg / tableta

USO EN:

Caninos domésticos.

CONTRAINDICACIONES

Debe manejarse de manera cuidadosa en pacientes que cursen con gastritis, úlcera gástrica, úlcera duodenal, o enfermedad renal. No se recomienda administrarlo con antiinflamatorios esteroidales ni en combinación con otros antiinflamatorios no esteroidales. Reduce el efecto diurético de la Furosemida.

ADVERTENCIAS

No utilizar en animales con hipersensibilidad a la misma.

No debe usarse en gatos a no ser que sea administrado por vía intramuscular o intravenosa, en hembras gestantes o en periodo de lactancia.

Los signos reportados con mayor frecuencia asociados a reacciones adversas al carprofeno son vómito, diarrea, letargo y disminución del apetito, se pueden presentar efectos graves tales como lesiones hepatocelulares, trastornos hematológicos y/o enfermedad renal.

En perros geriátricos o perros con enfermedades crónicas (por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, insuficiencia renal o hepática) pueden estar en mayor riesgo de desarrollar toxicidad mientras reciben este medicamento.

TOXICIDAD Y ANTÍDOTO

En los estudios toxicológicos de los perros, la dosificación de hasta 10 veces su dosis máxima, ocasiona que algunos perros desarrollen hipoalbuminemia, melena o incrementos de los niveles séricos de ALT, aunque existe cierta variabilidad. Existen hallazgos comunes tales como vómito, anorexia, deshidratación, dolor abdominal.

En caso de intoxicación, debe utilizarse la administración de medicamentos antiseoretos, inhibidores de la bomba de protones, sucralfato y/o carbón activado.

PRESENTACIÓN:

Caja con blíster de 10 tabletas.



INFORMACIÓN MÉDICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DOLFENO 120

Carprofeno
120 mg / tableta

ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar seco y fresco a no más de 25°C.

Protéjase de la luz.

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Consulte al Médico Veterinario.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.

HECHO EN MÉXICO POR:

INNOPHARMA, S.de R.L. de C.V.

Av. San Pablo No 79 –C,

Col. Santa Bárbara,

Alc. Azcapotzalco, CP 02230,

Ciudad de México,

Tel: (55) 53 82 22 89

ventas@innopharma.com.mx

www.innopharma.com.mx