



INFORMACIÓN MÉDICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS

Neomastil

(Sulfato de neomicina/Tetraciclina HCL/ Papaína/ Prednisolona)
(225 mg/ 200 mg/ 50 mg/ 16 mg) / 10 mL
Suspensión Intramamaria

NEOMASTIL ESPECIAL

No de Registro Q-0666-083

FÓRMULA:

Cada 10 mL contiene:

Sulfato de neomicina	225 mg
Tetraciclina HCL	200 mg
Papaína	50 mg
Prednisolona	16 mg
Vehículo c.b.p.	10 mL

INDICACIONES:


NEOMASTIL ESPECIAL, Es una combinación antibiótica indicada para la prevención, tratamiento y control de la mastitis clínica, subclínica, aguda o crónica, durante el período de lactación.

Ejerciendo su acción bacteriostática y bactericida sobre las bacterias gram positivas y gram negativas, entre ellas, variedades susceptibles como *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus sp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Proteus vulgaris*, especies de *Brucella*, *Pasteurella*, *Campylobacter* y *Salmonella sp.* y *Mycobacterium*.

Ayuda a combatir el biofilm generado por las bacterias.

FARMACOCINETICA y FARMACODINAMIA

Neomicina sulfato: Asociada al excipiente de larga duración presente en la fórmula, extiende su acción hasta por 4 semanas. La neomicina es el antibiótico más utilizado en combinaciones de drogas debido a su amplio espectro antibacteriano (Ziv, 1980a). Tiene una alta afinidad por las proteínas del tejido mamario y una baja tasa de absorción, lo que explica en parte su permanencia relativamente prolongada en la glándula (Ziv, 1980b). La excreción del fármaco absorbido es renal. El 97% no absorbido se elimina por heces inalterado. El mecanismo de acción consiste en la unión irreversible del antibiótico al segmento 30S del ribosoma, por lo que da un resultado biocida. No disminuye su eficacia en presencia de pus.

	INFORMACIÓN MÉDICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS
	Neomastil (Sulfato de neomicina/Tetraciclina HCL/ Papaína/ Prednisolona) (225 mg/ 200 mg/ 50 mg/ 16 mg) / 10 mL Suspensión Intramamaria

Las tetraciclinas son antibióticos de amplio espectro; actúan eficazmente contra bacterias gram positivas y en menor grado contra Gram (-). Se reabsorbe en el intestino, se concentran en hígado y se excretan en bilis, debido a este circuito entérico-sanguíneo-biliar, las tetraciclinas producen valores plasmáticos adecuados, aún después de 24 horas de haberse administrado. Logran concentrarse en todo el organismo. Atraviesan barrera placentaria e incluso se encuentran en la circulación fetal. Se excretan principalmente por los riñones y se eliminan lentamente, lo cual explica porqué persisten valores plasmáticos elevados durante mucho tiempo. Así mismo se excretan por heces.

DOSIS:

Para su uso en bovinos productores de leche, aplicar 1 jeringa por cada cuarto afectado, cada 12 ó 24 horas, según la severidad del caso, durante 3 a 5 días o de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Infusión intramamaria. Para lograr un mejor efecto y difusión se recomienda limpiar el pezón afectado y aplicar el producto, al término de la aplicación dar un ligero masaje sobre la glándula mamaria.

USO EN: Bovinos productores de leche

ADVERTENCIAS:

No utilizar para consumo humano, la leche de los animales tratados, hasta 120 horas (5 días) posteriores a la última aplicación.

No usar este producto 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

Mantener este producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consérvese este medicamento en un lugar seco y fresco.

Protéjase de la luz.



INFORMACIÓN MÉDICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS

Neomastil

(Sulfato de neomicina/Tetraciclina HCL/ Papaína/ Prednisolona)
(225 mg/ 200 mg/ 50 mg/ 16 mg) / 10 mL
Suspensión Intramamaria

PRESENTACIÓN:

Jeringa con 10 mL

Caja con 20 jeringas.

Cubeta con 40 jeringas.

Consulte al Médico Veterinario.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.

HECHO EN MÉXICO POR:

INNOPHARMA, S. DE R.L. DE C.V.

Av. San Pablo No 79

Col. Santa Bárbara.

C.P. 02230, Azcapotzalco, Ciudad de México.

Tel:(55) 26 26 91 00, Ext. 512-522

53 82 22 89 y 5985 3020

e-mail: ia_ventas@loeffler.com.mx

www.loefflervet.com.mx