	<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b> <b>PRODUCTOS VETERINARIOS</b>
	<b>TOLEDINN®</b> <b>Ácido Tolfenámico</b> <b>Suspensión Oral</b> <b>20 mg / mL</b>

## **TOLEDINN®**

No de Registro Q-0666-058

### **FÓRMULA:**

Cada mL contiene:

Ácido Tolfenámico.....20 mg

Vehículo c.b.p.....1 mL

### **INDICACIONES TERAPÉUTICAS**


**TOLEDINN®**. Es un potente antiinflamatorio no esteroideo con acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética indicado en todos aquellos procesos traumáticos, quirúrgicos osteoarticulares, músculo-esqueléticos, tendinitis, hernia discal, displasia de cadera, procesos odontológicos e infecciosos que cursan con dolor, inflamación y fiebre.

### **FARMACODINAMIA**

El Ácido Tolfenámico inhibe las ciclooxigenasas, adicionalmente tiene una acción antagonista directa sobre los receptores de las prostaglandinas y tromboxanos, causando una reducción en la síntesis de ambas sustancias, principales mediadores de los procesos inflamatorios.

En su acción analgésica inhibe la generación del impulso nervioso nociceptivo a nivel periférico, elevando el umbral del dolor.

Produce vasodilatación periférica aumentando la pérdida de calor, provocando su acción antipirética.

	<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b> <b>PRODUCTOS VETERINARIOS</b>
	<b>TOLEDINN®</b> <b>Ácido Tolfenámico</b> <b>Suspensión Oral</b> <b>20 mg / mL</b>

## FARMACOCINÉTICA

El Ácido Tolfenámico es absorbido con facilidad después de la administración oral. En los perros, los niveles plasmáticos pico son alcanzados de 2 a 4 horas después de la dosificación. La recirculación enterohepática se incrementa si se administra con alimentos. Esto puede aumentar la biodisponibilidad, pero también crea una mayor variabilidad en la biodisponibilidad que cuando se administra en ayunas.

El volumen de distribución en los perros está reportado en 1.2 L / kg; se distribuye por todo el organismo, con una mayor concentración en el plasma, tracto digestivo, hígado, pulmón y riñón. Por el contrario, la concentración en cerebro es escasa. Tiene una vida media de eliminación de aproximadamente 6.5 horas, su eliminación es principalmente vía renal siguiendo la biliar y fecal. La duración del efecto antiinflamatorio es de 24 - 36 horas.

## PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO

No exceder la dosis establecida, ni la duración del tratamiento.

No administrar conjuntamente o dentro de las primeras 24 horas con otras drogas antiinflamatorias no esteroideas, así como de fármacos potencialmente nefrotóxicos.


No administrar en animales que cursen con enfermedades cardíacas, hepáticas y renales.

No administrar en animales que presenten ulceración o hemorragia del tracto gastrointestinal o con antecedentes de discrasia hemática o hipersensibilidad al producto.

No administrar en animales menores de 6 semanas; así como animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos.

No utilizar tras la anestesia hasta que el animal esté totalmente recuperado de la misma.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

	<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b> <b>PRODUCTOS VETERINARIOS</b>
	<b>TOLEDINN®</b> <b>Ácido Tolfenámico</b> <b>Suspensión Oral</b> <b>20 mg / mL</b>

El Ácido Tolfenámico posee excelente tolerancia como AINE de primera elección. A veces pueden aparecer vómitos y diarreas durante el tratamiento, así como poliuria y polidipsia que cesan al suspender el tratamiento.

### **DOSIS**

Caninos y Felinos domésticos: 1 ml por cada 5 Kg de peso corporal equivalente a 4 mg de Ácido Tolfenámico por cada Kg de peso corporal. La dosis se puede repetir a las 24 horas.

### **VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Oral.

### **PRESENTACIÓN**

Frasco con 50 mL. Con accesorio dosificador.

### **RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO**

Consérvese en un lugar seco y fresco a una temperatura menor a 25°C

Protéjase de la Luz.


No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

Su venta requiere receta médica.

**Consulte al Médico Veterinario.**

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.**

**HECHO EN MÉXICO POR:**

	<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b> <b>PRODUCTOS VETERINARIOS</b>
	<b>TOLEDINN®</b> <b>Ácido Tolfenámico</b> <b>Suspensión Oral</b> <b>20 mg / mL</b>

**INNOPHARMA, S. DE R. L. DE C.V.**

Avenida San Pablo No 79-C

Col. Santa Bárbara

Alc. Azcapotzalco, CP 02230

Ciudad de México.

Tel: (55) 5382 2289

[ventas@innopharma.com.mx](mailto:ventas@innopharma.com.mx)

[www.innopharma.com.mx](http://www.innopharma.com.mx)